

સેક્સડ સીમેનનો
(લિંગ નિર્ધારિત વિચ્ચનો)
ઉપયોગ કરવા માટેની સુચનાઓ



સફળ ગર્ભધારણ માટે સેક્સડ સીમેનનો (લિંગ નિર્ધારિત વિર્યનો) ઉપયોગ કરવા માટે ધ્યાને લેવા માટેની ખાસ સુચનાઓ

આટલું કરો

આટલું ના કરો

સેક્સડ સીમેનનો (લિંગ નિર્ધારિત વિર્યનો) ઉપયોગ તમામ પશુઓમાં ન કરવો જોઈએ	સેક્સડ સીમેન નો (લિંગ નિર્ધારિત વિર્યનો) ઉપયોગ નીચે મુજબના પશુઓમાં કરવાથી શ્રેષ્ઠ પરિણામો મળે છે. 1. પ્રથમ વેતરવાળા 2. બીજા વેતરવાળા પસંદ કરવામાં આવેલ પશુ જાતિય આરોગ્ય રીતે સ્વસ્થ હોવું જોઈએ.	દરેક પશુ માટે ઉપયોગ કરવો હિતાવહ નથી. મોટી ઉંમરના એટલે કે ત્રીજા વેતર પછીના અને વારંવાર ઉથલા મારતા પશુઓમાં ઉપયોગ ન કરવો જોઈએ. જાતિય આરોગ્યને લગતાં રોગો (સમસ્યાઓ) જેવી કે ડિસ્ટોકીયા (કષ્ટ પ્રસવ), ગર્ભાશય ગ્રીવાનો સોજો, ગર્ભાશયનો સોજો, બગાડ અથવા મેલી રહી ગઈ હોય તેવા પશુઓમાં ઉપયોગ કરશો નહીં.
પશુ (ગાય/ભેંસ) માં શરીરનું લઘુત્તમ વજન	પુખ્ત ઉંમરના થયેલ ગાય/ભેંસમાં કૃત્રિમ બીજદાન ઉંમર આધારિત નહીં પરંતુ શરીરના વજન અનુસાર કરાવવું જોઈએ. સેક્સડ સીમેનના (લિંગ નિર્ધારિત વિર્યનો) ઉપયોગ થકી સફળ ગર્ભધારણ માટે પુખ્ત ઉંમરના અને પ્રથમ વખત વિચારા માટે ના પશુનું વજન આદર્શ રીતે 300 કિલોની નજીક હોવું જોઈએ. સેક્સડ સીમેનના (લિંગ નિર્ધારિત વિર્યનો) ઉપયોગ થકી સફળ ગર્ભધારણ માટે પ્રથમ વખત ગરમી/વેતરમાં આવતાં પશુઓને પ્રથમ બે વખતની ગરમી છોડ્યા બાદ બીજદાન કરાવવું હિતાવહ છે.	પ્રથમ વખત ગરમીમાં આવતાં અને ઓછું વજન ધરાવતાં માદા પશુઓમાં ઉપયોગ કરવો હિતાવહ નથી. પ્રથમ વખત ગરમીમાં આવતાં માદા પશુઓમાં શરૂઆતના થોડા પાણી/ગરમીના ચક્રો ટુંકા અને નોન ઓવ્યુલેટરી ચક્રો હોય છે જેથી કૃત્રિમ બીજદાન કરવા છતાં સફળ ગર્ભ ધારણ થતુ નથી.
વેતર/પાણીમાં આવવું/ગરમીમાં આવવું	નીચેની આકૃતિ - 1 માં દર્શાવ્યા અનુસાર પશુ સંપૂર્ણ ગરમીના ચિહ્નો દર્શાવે એટલે કે ક્ષાળ ભરે ત્યારે અને શક્ય હોય ત્યાં સુધી સવારે અથવા સાંજે. નીચેની આકૃતિ - 2 માં દર્શાવ્યા મુજબ ચોનીની લાળી સ્પષ્ટ, પારદર્શક અને તાંતણાયુક્ત હોવી જોઈએ. ભૌગોલિક ડ્રસ્ટી સેક્સડ સીમેનનો ઉપયોગ નીચા તાપમાન અને ઘાસચારાની પુરતી ઉપલબ્ધતા હોય તેવા સમયે શ્રેષ્ઠ પરિણામો મળતા હોઈ સપ્ટેમ્બરથી એપ્રિલ ના સમયગાળાની સંવર્ધન ઋતુમાં ઉત્તમ ગર્ભધારણ મેળવી શકાય છે.	બે કે તેથી વધુ વખતના હીટ સ્ટ્રેસ સ્કોર ધરાવતાં પશુઓમાં ઉપયોગ કરશો નહીં. ગરમ અને ભેજવાળા મહિનામાં ઉપયોગ કરશો નહીં. વધુ ભેજ અને વધુ ગરમીને કારણે હાંફતા માંદા પશુઓ જૈવિક ફેરફારોમાંથી પસાર થાય છે જે ગર્ભધારણને અટકાવે છે.
પેકેજીંગ	લિક્વીડ નાઇટ્રોજન કન્ટેનરમાં દરેક ગોબ્લેટ 10 સેક્સડ સીમેન ડોઝથી ભરેલું હોય છે. પેટા વિતરણ માટે આખા ગોબ્લેટને ટ્રાન્સફર કરવું જોઈએ.	સેક્સડ સીમેન ડોઝનું વધારે પડતું હેન્ડલીંગ ટાળવું જોઈએ.
સેક્સડ સીમેન ડોઝની ઓળખ	નીચેની આકૃતિ - 5 માં દર્શાવ્યા અનુસાર કેનીસ્ટર ટેગ અથવા માર્કર સ્ટ્રીપ વડે બુલની ઓળખ કરો. દરેક ગોબ્લેટની અંદર રહેલી માર્કર સ્ટ્રીપમાં બુલનું નામ હોય છે. ઈચ્છિત કેનીસ્ટરને શક્ય તેટલી વહેલી તકે તેની મુળ સ્થિતિમાં પરત મુકી દેવું	નીચેની આકૃતિ - 3 માં દર્શાવ્યા અનુસાર બુલને ઓળખવા માટે સ્ટ્રો/ગોબ્લેટને ફ્રોસ્ટ લાઈનથી ઉપર ઉઠાવશો નહીં.


આકૃતિ : 1
સ્ટેબ્લિંગ હીટ



આકૃતિ : 2
સર્વોર્થક સ્નાયુ(ચોનીની નાળી)



આકૃતિ : 3
કેનીસ્ટરને ફ્રોસ્ટ લાઈનથી ઉપર ન ઉઠાવશો.



આકૃતિ : 4
ગર્ભાશયના મુખ્ય ભાગમાં વીર્યનું પ્લેસમેન્ટ.



સેક્સ સીમેન ડોઝનું સ્થળાંતર	એક કન્ટેનરમાંથી બીજા કન્ટેનરમાં સેક્સ સીમેન ડોઝ ભરેલા ગોબ્લેટને બને તેટલા ઝડપથી સ્થળાંતર કરવા જોઈએ. કન્ટેનરમાંથી સેક્સ સીમેન ડોઝની સ્ટ્રો મેળવવાનું બને તેટલું ઝડપથી થવું જોઈએ.	સેક્સ સીમેન ડોઝને વધુ ઉચ્ચ તાપમાનના સંપર્કમાં આવવા ન દેશો. ઉચ્ચ તાપમાનથી સિમેન ડોઝની ગુણવત્તામાં ઘટાડો થાય છે.
સેક્સ સીમેન ડોઝનું હેન્ડલીંગ	સેક્સ સીમેન ડોઝને અનિવાર્યપણે ચિપિયા વડે પકડવા જોઈએ.	સેક્સ સીમેન ડોઝના થોઈંગ માટે હથેલીનો ઉપયોગ કરશો નહીં.
વિર્યનું થોઈંગ (પ્રવાહીકરણ)	નીચેની આકૃતિ - 6 માં દર્શાવ્યા અનુસાર થોઈંગ કરવા માટેના પાણીનું તાપમાન તપાસવા માટે થો મોનિટરનો ઉપયોગ કરો. અને યોગ્ય તાપમાને સ્ટ્રોને 30-60 સેકન્ડ સુધી રાખી થોઈંગ કરવું જોઈએ. જો એકથી વધુ પશુને બીજદાન કરવાનું હોય તો પણ એક સમયે માત્ર એકજ સ્ટ્રોનું થોઈંગ કરવું જોઈએ. સેક્સ સીમેન ડોઝને નાઈટ્રોજનમાંથી બહાર કાઢ્યા પછી તરતજ સ્ટ્રોને ઝટકો આપો અને થોઈંગ વખતે આખી સ્ટ્રો પાણીમાં ડુબાડવી જોઈએ. સેક્સ સીમેન ડોઝની સ્ટ્રોને ઝટકો આપતી વખતે લેબોરેટરી સીલના છેડા બાજુથી પકડવી જોઈએ.	એક સમયે એકથી વધુ સેક્સ સીમેન ડોઝનું થોઈંગ કરશો નહીં. થોઈંગ કરવાના પાણીનું તાપમાન આંગળીથી તપાસવા કરતાં થો મોનિટરનો ઉપયોગ કરવો જોઈએ.
ગર્ભાધાન	સેક્સ સીમેન ડોઝના થોઈંગ પહેલાં પશુ, એઆઈ ગન, શીથ, મોજા વગેરે તૈયાર કરો જેથી ડોઝ થોઈંગ પછી તરતજ કૃત્રિમ બીજદાન થઈ શકે. નીચેની આકૃતિ - 4 માં દર્શાવ્યા અનુસાર ગર્ભાશયના મુખ્ય ભાગમાં વીર્ય મુકવા માટે એઆઈ ગનના પ્લંજરને ધીમે ધીમે દબાવો કરો. પશુઓમાં સફળ ગર્ભધારણાનો દર લગભગ 40% ની આસપાસ રહે છે. જેથી સફળ ગર્ભધારણા મેળવવા માટે સેક્સ સીમેન ડોઝનો ઉપયોગ સતત બે થી ત્રણ વાર કરવો જોઈએ.	સેક્સ સીમેન ડોઝના થોઈંગ પછી પશુ અથવા એઆઈ સાધનો તૈયાર કરશો નહીં. પશુના ગર્ભાશયના મુખમાં અથવા ગર્ભાશયના શીંગમાં વીર્ય મુકવાનું ટાળો બીજદાન કરતી વખતે એઆઈ ગનના પ્લંજર દ્વારા અતિશય દબાવો આપવાનું ટાળો પશુમાં બીજદાન દરમિયાન અંડાશય/ફોલીકલને સ્પર્શવાનું ટાળો
પોષક તત્વો (પશુ પોષણ)	કૃપા કરીને પુરતી ખાતરી કરો કે સેક્સ સીમેન ડોઝના ઉપયોગ થકી કૃત્રિમ બીજદાન પહેલા પશુને પુરતા પ્રમાણમાં પોષણક્ષમ આહાર આપવામાં આવે છે જેથી સફળ ગર્ભધારણાનો દર વધારે મેળવી શકાય છે. સેક્સ સીમેન ડોઝના ઉપયોગ થકી કૃત્રિમ બીજદાન પહેલા પશુને ઓછામાં ઓછા બે માસ પહેલા કૃમિનાશક દવાનો ડોઝ આપવો જરૂરી છે જેની ખાતરી કરવી તેમજ પશુને સારી ગુણવત્તાયુક્ત ખનિજ મિશ્રણ સાથે આપવા ભલામણ કરવી.	કુપોષિત હોય તેવા પશુઓમાં સેક્સ સીમેન ડોઝનો ઉપયોગ કરવાનું ટાળવું જોઈએ. નીચેની આકૃતિ - 7 માં દર્શાવ્યા અનુસાર કુપોષિત પશુઓમાં સેક્સ સીમેન ડોઝ તથા સામાન્ય સિમેન ડોઝ માં પણ ગર્ભધારણાની શક્યતા ઓછી હોય છે.
QC Testing (થો મોટીલીટી પછી)	નીચેની આકૃતિ - 8 માં દર્શાવ્યા અનુસાર સેક્સ સીમેન ડોઝની પોસ્ટ થો મોટીલીટી IVOS - II (CASA) દ્વારા જ કરવી જોઈએ.	સેક્સ સીમેન ડોઝની પોસ્ટ થો મોટીલીટી ટેસ્ટ ફેઝ કોન્ટ્રાસ્ટ માઈક્રોસ્કોપ દ્વારા ન કરવી જોઈએ.

આકૃતિ : 5
સ્ટ્રોની ઓળખ માટે ગોબ્લેટ અને માર્કર સ્ટ્રીપ.




આકૃતિ : 6 થો મોનિટર




આકૃતિ : 7 NEB



આકૃતિ : 8 CASA IVOS II



આપો સેક્સસેલ સાથે લાભ મેળવીએ!



પશુ પસંદગી

વોડકી/ખડેલી

- કૃત્રિમ બીજદાન પહેલાં બે વખત પ્રાકૃતિક ગરમી/અતુ ચક્ર દર્શાવેલ હોવા જોઈએ.
- કૃત્રિમ બીજદાન માટે પસંદ કરવામાં આવેલ વોડકી/ખડેલીનું ઓછામાં ઓછું 250 થી 300 કિલોગ્રામ વજન હોવું જોઈએ.
- કૃત્રિમ બીજદાન માટે પસંદ કરવામાં આવેલ પશુને ઉંમર આધારિત નહીં પરંતુ વજન અનુસાર પસંદગી કરવી જોઈએ.

ગાય / ભેંસ

- પ્રથમ/બીજા/ત્રીજા વેતરની ગાય/ભેંસ કૃત્રિમ બીજદાન માટે શ્રેષ્ઠ છે.
- પશુ પર્યાપ્ત શારીરિક ક્ષમતા ધરાવતો હોવું જોઈએ અને નિયમિત રીતે ગરમીમાં આવતો હોવું જોઈએ.
- ડીસ્ટોકીયા(કષ્ટપ્રસવ), ગર્ભાશયનો સોજો, ગર્ભાશયમાં રસી(પાયોમેટ્રા) અથવા મેલી(બગાડ) રહી ગઈ હોય તેવા પશુઓમાં સેક્સડ સીમેન ડોઝનો ઉપયોગ કરવો નહિ.
- વધુ ભેંસ કે ગરમીના કારણે હાંફતા પશુઓમાં સેક્સડ સીમેન ડોઝનો ઉપયોગ કરવો નહિ.
- વારંવાર ઉથલા મારતા પશુઓમાં સેક્સડ સીમેન ડોઝનો ઉપયોગ કરવો નહિ.
- શારીરિક રીતે અશક્ત અને નબળાઈ ધરાવતા પશુઓમાં પણ સેક્સડ સીમેન ડોઝનો ઉપયોગ કરવો નહિ.



પશુ તૈયારી

ઓળખ

- ખાતરી કરો કે પશુને 12 આંકના ઈનાફ કોડ વડે ઈયરટેંગ કરવામાં આવેલ છે.

કૃમિનાશન

- ખાતરી કરો કે પશુઓને નિયમિત અંતરાલ પર કૃમિનાશક દવાનો ડોઝ આપવામાં આવેલ છે.

પોષક તત્વોનું સંચાલન

- ગર્ભાધાન પ્રક્રિયાના 30 દિવસ પહેલાં ગુણવત્તાયુક્ત ખનીજ તત્વો અને વિટામીનનું મિશ્રણ ખોરાકમાં આપો.



ગર્ભાધાન પ્રક્રિયા

ગરમીની ઓળખ

- ગરમીના ચિહ્નો ઓળખો એટલે કે સ્ટેન્ડીંગ હીટ, યોનિમાર્ગમાંથી લાળીનો સ્ત્રાવ, અજંપો, બીજા પશુના જનનાંગો સુંઘવા વગેરે
- કૃત્રિમ બીજદાનનો શ્રેષ્ઠ સમય - સવારે અથવા મોડી સાંજે.

ગર્ભાધાન

- ગોબ્લેટને ફ્રોસ્ટ લાઈનથી ઉપર ઉઠાવશો નહિ
- થોઈંગ કરવા માટેના પાણીનું તાપમાન 37° સે. તપાસવા થો મોનીટરનો ઉપયોગ કરો
- એક સમયે એક જ ડોઝનું થોઈંગ કરો. થોઈંગ કરવા માટે ડોઝને 30-60 સેકન્ડ માટે સંપૂર્ણપણે પાણીમાં ડૂબાડવું જોઈએ.
- થોઈંગ પછી શક્ય તેટલું ઝડપી બીજદાન કરવું જોઈએ.
- વીર્યને હંમેશા ગર્ભાશયના મુખ્ય ભાગમાં મૂકો ગર્ભાશયના મુખ કે સીંગમાં મૂકવાનું અને અંડાશય/ફોલિકલને સ્પર્શવાનું ટાળો.
- પ્રજનનની માહિતીને રેકોર્ડ કરો
- કેનીસ્ટર ટેગ અથવા માર્કર સ્ટ્રીપ વડે બુલની ઓળખ કરો.

• મહત્તમ ગર્ભધારણ મેળવવા માટે એવી ભલામણ કરવામાં આવે છે કે વધારે પશુઓ રાખતાં ફાર્મમાં હીટ સીક્રીનાઈઝેશન કરવું જોઈએ જેથી કૃત્રિમ બીજદાન કાર્યકરનો સમય બચે અને મહત્તમ સફળ ગર્ભધારણ મેળવી શકાય. (હીટ સીક્રીનાઈઝેશનની ભલામણ ફક્ત ગાયોમાં જ કરવામાં આવી છે.)

• વધુ માહિતી માટે નજીકના પશુચિકિત્સકની સલાહ લો.

જનસ બ્રીડિંગ ઈન્ડિયા પ્રા. લિ. (ABS ઈન્ડિયા)

રજિસ્ટર્ડ ઓફિસ: ઇન્ટર્નિયા પ્રિમાઈસિસ કો-ઓપ સોસાયટી, 5મો માળ, સી વિંગ,

DA યુનિટ નંબર 505/506 પાસે, દગાડી બંગલો, વાકડેવાડી, પુણે - 411005 (મહા)

www.genusabsindia.com ✉:abs.india@genusplc.com ☎:1800 210 9210